



Stutenfütterung & Saugfohlenfütterung





Gliederung



- Trächtigkeit / Laktation
 - Wie hoch ist der Bedarf?
 - Versorgungssituation
 - Rationen
- Saugfohlenfütterung
- Vermeidung von OCD („Chips“)



Wie bekomme ich meine Stute tragend?



- „Abspecken“ im Herbst
 - „Fit statt fett“
- 3 - 4 Wochen vor dem Besamen bis 4 Wochen danach auf β -Carotinversorgung achten
- 3 Wochen vor der Bedeckung Energiemenge und Eiweißqualität anheben,
→ Derby Zucht / Vital





Tragende Stuten



- Im letzten Trächtigkeitsdrittel Energiegehalt und Eiweißqualität anheben (Derby Zucht)

600 kg LM	Energie (MJ DE)	Verd. Eiweiß (Gr. v. Rp.)
8. Trächtigkeitsmonat	90	515
3. Laktationsmonat	140	1160

- Auf ausreichende Wasserversorgung achten!
(50 -60l)



Rationsbeispiel



	8. Tr.-Monat in kg	3. Lakt.-Monat in kg
Hafer	1	2
Derby Zucht	2,5	4
Grassilage (55 % TS)	9	13
Stroh	1	0,5



Rauhfutter



05.03.2012



Raufutterqualitäten



Rohnährstoffe	Heu	Silage	Luzerne	Stroh
Trockensubstanz	86 %	55 %	86 %	86 %
v.Eiweiß	6 %	3,5 %	10 %	1 %
Rohfaser	26 %	17 %	27 %	38 %
v. Energie	8 MJ	5 MJ	8,1 MJ	4,5 MJ





Versorgungssituation / Stall

1. – 2. Laktationsmonat



	Abweichungen der Nährstoffaufnahme in %					Bedarf
	< - 30	- 30 - / - 10	- 10 / + 10	+ 10 - 30	> 30	
vRp, g	35,2	31,2	23,6	6,0	4,0	1275
Ca, g	10,4	16,6	23,9	14,6	34,5	61
P, g	8,5	28,1	37,0	13,9	12,5	46
Zn, mg	35,9	32,9	15,5	8,1	7,6	600
Cu, mg	15,7	13,5	40,5	12,3	18,1	120



Saugfohlen



- Das Wachstum des Fohlens ist im ersten Halbjahr am intensivsten.
- Auf ausgewogene Vitaminisierung und Mineralisierung achten!
- Besonders die Versorgung mit Kupfer, Zink und Selen ist für das Knorpelwachstum unerlässlich (Derby Top Start).



OCD - Osteochondrosis



- Genetische Veranlagung
- Haltung
- Ernährung



Absetzerfütterung



- Wenig, aber hochwertig füttern
 - Aminosäuren, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine, z.B. Derby Youngstar
- Ab dem 8. Lebensmonat die Eiweißgehalte deutlich reduzieren.



Danke für ihre Aufmerksamkeit







	ab 4. Woche	ab 8. Woche	3. + 4. Monat	5. Monat	6. Monat/ ab absetzen	bis Ende 1. Jahr
DERBY Top Start	20ml alle 2 Tage 20-40ml/Tag					
DERBY Fohlen- Mineral		60g/Tag 60g/Tag 80g/Tag				
DERBY Youngstar	anfüttern	0,5kg/Tag 1kg//Tag 2kg/Tag 3,5kg/Tag				



Youngstar




- hochwertiges Starterfutter in Pelletform
- stellt die Versorgung des Fohlens vor und nach dem Absetzen sicher
- leichte Handhabung und Lagerung
- kritische Wachstumsphasen werden leicht überbrückt



Fohlenmineral



- **Eigenschaften:**
- fohlenmaulgerecht pelletiert und speziell auf die Bedürfnisse intensiv wachsender Saugfohlen abgestimmt
- enthält die für die Skelettentwicklung unverzichtbare Mineralstoffe und Vitamine
- Die wichtigen Spurenelemente Kupfer und Zink liegen organisch gebunden, als Aminosäuren–Chelate vor



- wirkt der Entstehung ernährungsbedingter Entwicklungsstörungen entgegen
- gleicht Nährstofflücken aus dem Grundfutter aus



Saugfohlen



- Auf ausreichende Aufnahme der Biestmilch (Kolostralmilch) achten. Dem Fohlen vom ersten Tag an Bewegung ermöglichen.
- Bei Milchmangel der Stute die Eiweiß- und Energieversorgung überprüfen und ggf. erhöhen (Zuchtfutter zufüttern), evtl. Fohlenmilch an das Fohlen verabreichen.
- Das Fohlen an frühzeitige Aufnahme von Beifutter gewöhnen.



Laktation 3. – 4. Monat (Weideperiode)



	Abweichungen der Nährstoffaufnahme vom Bedarf tragender Stuten in %					Bedarf
	< - 30	- 30 - / - 10	- 10 / + 10	+ 10 – 30	> 30	
Ca, g	38,4	38,1	12,2	5,5	5,8	61
Zn, mg	35,9	32,9	15,5	8,1	7,6	600
Cu, mg	15,7	13,5	40,5	12,3	18,1	120



Laktation, 1. - 2. Monat (Stallperiode)



	Abweichungen der Nährstoffaufnahme vom Bedarf tragender Stuten in %					Bedarf
	< - 30	- 30 - / - 10	- 10 / + 10	+ 10 - 30	> 30	
vRp	35,2	31,2	23,6	6,0	4,0	1275
DE	10,7	42,4	35,5	9,3	2,1	135
Ca, g	10,4	16,6	23,9	14,6	34,5	61
P, g	8,5	28,1	37,0	13,9	12,5	46



Hengstvorbereitung

